

Klinik / Praxis:

Patientendaten:

Der Eingriff ist vorgesehen am (Datum):

## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,


um Ihre Beschwerden (Gallenkoliken, Gelbsucht, Entzündung von Leber, Galle oder Bauchspeicheldrüse) zu bessern, ist bei Ihnen die operative Entfernung Ihrer Gallenblase geplant.

Diese Informationen über den Ablauf der Operation, die möglichen Zwischenfälle und über Verhaltensmaßnahmen vor und nach dem Eingriff dienen zu Ihrer Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im Weiteren Arzt). Im Gespräch wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- und Nachteile des geplanten Verfahrens gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über Ihre spezifischen Risiken und die sich daraus möglicherweise ergebenden Komplikationen aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen und Sie ausführlich über die Operation aufzuklären. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in die Ihnen vorgeschlagene Operation erteilen oder diese ablehnen.

Bitte lesen Sie die nachstehenden Informationen und füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus. Es ist selbstverständlich, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

### LAGE UND FUNKTION DER GALLENBLASE

Die Gallenblase befindet sich unterhalb der Leber. Sie speichert die von der Leber produzierte Galle und gibt sie bei Bedarf in den Darm ab um die Verdauung von Fetten zu erleichtern. Ein Verlust der Gallenblase hat keine negativen Auswirkungen auf die Verdauungsfunktion, da das Gallensekret weiter durch die Leber produziert und direkt in den Darm abgegeben wird.




Steine der Gallenblase können völlig symptomfrei bleiben. Wenn sie sich allerdings durch den Gallengang bewegen, können sie Gallenkoliken mit sehr starken, schubweisen Schmerzen, auslösen. Ein Verschluss der Gallenwege durch einen Gallenstein kann zu einem Aufstau der Gallenflüssigkeit mit Gelbsucht (Ikterus), einer Entzündung der Gallenwege, Gallenblase oder Bauchspeicheldrüse führen.

Wenn sich die Gallenblase entzündet, kann dies mit unangenehmen und teils starken Schmerzen verbunden sein und es besteht die Gefahr eines Durchbruches.

In all diesen Fällen sollte die Gallenblase entfernt werden um weitere Komplikationen zu vermeiden. Bei Tumoren in der Gallenblase ist ebenfalls eine Entfernung der Gallenblase angezeigt.

### ABLAUF DER OPERATION

Die operative Entfernung der Gallenblase ist auf zwei Arten möglich: auf konventionelle Weise mit größerem Bauchschnitt (häufig unterhalb des rechten Rippenbogens) oder minimal-invasiv mit einer Bauchspiegelung (Laparoskopie).



Heutzutage ist die Operation mittels Bauchspiegelung das Standardvorgehen. Über einen 1 - 2 cm großen Schnitt im Bereich des Nabels wird ein dünnes Rohr (Trokare) für die Laparoskop-Kamera eingebracht. Dann wird der Bauch mit Kohlendioxid-Gas aufgeblasen