

VERSTEIFUNG DES HANDGELENKES

Information und Anamnese für Patienten zur Vorbereitung des erforderlichen Aufklärungsgesprächs mit dem Arzt

Klinik / Praxis:

Patientendaten:

Der Eingriff ist vorgesehen am (Datum):

- linke Hand
 rechte Hand

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihre Beschwerden und die bisherigen Untersuchungen haben bei Ihnen eine schwere Störung im Handgelenkbereich ergeben. Ihr Arzt hat Ihnen eine Operation mit Einsteifung (Arthrodese) des Handgelenkes vorgeschlagen.

Diese Informationen dienen zur Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im Weiteren Arzt). Im Gespräch wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über Ihre Risiken aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in die vorgeschlagene Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

URSACHEN DER ERKRANKUNG

Zwischen dem Unterarm mit Speiche und Elle und den Mittelhandknochen liegt das Handgelenk mit 2 Reihen von insgesamt 8 Handwurzelknochen, die die Beweglichkeit der Hand in alle Richtungen ermöglichen.

Durch Erkrankung dieser Handwurzelknochen kann es zu einer schmerzhaften Bewegungsstörung mit Kraftlosigkeit der Hand kommen. Ursachen dieser Störung können Abnutzung (Arthrose), Entzündung (z. B. Rheuma), ungünstig verheilte Knochenbrüche nach Unfällen, Nachgeben des Bandapparates mit Instabilität, Durchblutungsstörungen mit Absterben von Knochengewebe (z. B. am Mondbein), selten auch Tumore sein. Je nach Ursache können einzelne Anteile oder das gesamte Handgelenk betroffen sein. Sind die Schmerzen stark beeinträchtigend und sind alle anderen Therapieverfahren ausgereizt, kann mit der Versteifung einzelner, mehrerer oder aller Handwurzelknochen eine Schmerzreduzierung erreicht werden.

ABLAUF DER BEHANDLUNG


Die Behandlung erfolgt in regionaler Anästhesie (Plexusanästhesie) bzw. in Allgemeinanästhesie, über welche Sie gesondert aufgeklärt werden.

Bei dem Eingriff wird, wenn möglich, eine Blutleere angelegt. Hierzu wird der Arm umwickelt und die weitere Blutzufuhr mittels einer aufgepumpten Blutdruckmanschette unterbunden. Dadurch werden ein geringer Blutverlust und eine bessere Operationsicht gewährleistet.

Es sind verschiedene Operationsmethoden für eine Versteifung des Handgelenkes möglich:

- Versteifung der Knochen in der körpernahen Handwurzelreihe**
- mit Entnahme eines Handwurzelknochens
 - mit Einbeziehung der Speiche
- Versteifung der Knochen in der körperfernen Handwurzelreihe**
- mit Entnahme eines Handwurzelknochens

- Versteifung des kompletten Handgelenkes vom Mittelhandknochen bis zur Speiche**
- Andere:** _____
- Anlage von Knochenmaterial**
- aus dem Becken
 - aus der Speiche
- Fixierung der Versteifung mit**
- Platte
 - Schrauben und Drähten
 - Knochenspan



Bei der Operation werden die betroffenen Handwurzelknochen über einen Hautschnitt am Handrücken freigelegt. An den betroffenen Handwurzelknochen wird der Knorpel entfernt, so