

# VERSTEIFUNGSOOPERATION IM FUSSBEREICH

Information und Anamnese für Patienten zur Vorbereitung des erforderlichen Aufklärungsgesprächs mit dem Arzt

Klinik / Praxis:

Patientendaten:

Der Eingriff ist vorgesehen am (Datum):

- linker Fuß  
 rechter Fuß

## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen liegt eine gravierende Fehlstellung im Bereich der Fußwurzel/des Mittelfußes vor. Durch eine operative Behandlung sollen die Fehlstellung verbessert und somit Störungen beim Laufen sowie Schmerzen vermieden oder gelindert werden.

Diese Informationen dienen zur Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im Weiteren Arzt). Im Gespräch wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über Ihre Risiken aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in die vorgeschlagene Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

### URSACHEN DER ERKRANKUNG

Fußfehlstellungen können unterschiedliche Ursachen haben: Eine verbliebene angeborene Fehlstellung, Entzündungen, Diabetes, nach Unfällen oder als Zeichen einer neurologischen Erkrankung. Ziel einer Operation im Fußbereich ist es, einen belastungsfähigen Fuß zu erreichen oder zu erhalten, eventuelle Schmerzen zu verbessern und eine Schuhversorgung zu erleichtern.

### BEHANDLMÖGLICHKEITEN

Je nach Art und Ausprägung der Fußfehlstellung wird eine knöcherne Korrektur durch Entnahme eines Knochens meist in Keilform von oben (z. B. bei Hohlfußstellung) oder von der Außenseite (z. B. bei Klumpfußstellung) oder eine Knochenanlage (z. B. bei Plattfußstellung) durchgeführt. Dabei werden ein oder mehrere Gelenke im Bereich des Rückfußes/der Fußwurzel geöffnet, die Knorpelfläche entfernt und eine Gelenkversteifung durchgeführt. Die Stellung wird mit Metallteilen (Schrauben, Klammern, kleine Platten) oder einem äußeren Halteapparat, sog. Fixateur externe, gesichert. Ist die Fehlstellung durch ein Ungleichgewicht der Muskulatur verursacht, werden zusätzlich Muskeln bzw. Sehnen verlängert oder verlagert.

In Ihrem Fall ist folgende Operation geplant:

- Knochenentnahme im Bereich Fußwurzel/Mittelfuß  
 Knochenanlagerung im Bereich Fußwurzel/Mittelfuß

#### Versteifung

- Im unteren Sprunggelenk (Subtalgelenk)  
 In der körpernahen Fußwurzel (Chopart Gelenk)  
 In der körperfernen Fußwurzel (Lisfranc Gelenk)

#### Metallimplantat

- Schrauben  Klammern  Platten

#### Fixateur externe


#### Knochenentnahme am

- Becken  Schienbein  Wadenbein

### Zusätzlicher Eingriff an folgenden Muskeln/Sehnen:

- Sonstiges Verfahren:

### ABLAUF DER BEHANDLUNG



### ABLAUF DER BEHANDLUNG

Die Behandlung erfolgt in regionaler Anästhesie (Spinalanästhesie) bzw. in Allgemeinanästhesie, über welche Sie gesondert aufgeklärt werden.

Üblicherweise wird eine Blutleere angelegt. Hierzu wird das Bein umwickelt und die weitere Blutzufuhr mittels einer aufgepumpten Blutdruckmanschette unterbunden. Dadurch werden ein geringer Blutverlust und eine bessere Operationsicht gewährleistet.